

接種方法・接種間隔

商品名	シルガード9 (9価) ※1回目を15歳未満で接種した場合	ガーダシル (4価) シルガード9 (9価)	サーバリックス (2価)
(標準的な) 接種回数と間隔	<p>1回目 → 約6か月後 → 2回目</p>	<p>1回目 → 約2か月後 → 2回目 → 約4か月後 → 3回目</p>	<p>1回目 → 約1か月後 → 2回目 → 約5か月後 → 3回目</p>
※標準的な接種間隔が取れない場合の対応	<ul style="list-style-type: none"> ・2回目接種は、1回目から5か月以上の間隔をおく。(5か月以上の間隔をおかずに接種した場合は、3回接種と同じ接種間隔となります。) 	<ul style="list-style-type: none"> ・2回目接種は、1回目から1か月以上の間隔をおく ・3回目接種は、2回目から3か月以上の間隔をおく 	<ul style="list-style-type: none"> ・2回目接種は、1回目から1か月以上の間隔をおく ・3回目接種は、1回目から5か月以上かつ2回目から2か月半以上の間隔をおく
用法・用量	1回に0.5mlを筋肉内注射		
対応するHPVの型	6・11・16・18・31・33・45・52・58型 (9価)	6・11・16・18型 (4価) 6・11・16・18・31・33・45・52・58型 (9価)	16・18型 (2価)
<p>*原則、3回(または2回)の接種は同じHPVワクチンで行ってください。</p> <p>ただし、2価または4価HPVワクチンを未完了の方が、医師とよく相談のうえで、9価HPVワクチンを接種することは可能です。 (2価→4価、4価→2価の交接種は認められていません。)</p> <p>*シルガード9 (9価) の1回目を15歳未満で接種した場合、2回目が15歳以上となった場合でも2回接種です。(接種間隔が5か月以上の場合)</p>			